

# RESULTADOS:

Estudio diagnóstico de la Situación de Estigma y Discriminación hacia Poblaciones Claves, en 15 Servicios de Atención Integral al VIH (SAI) priorizados, en República Dominicana.

Consultora:

Dra. Claudia Valdez

Presentado a CONAVIHSIDA  
Enero 2017




Abreviaturas: PG - Población General, PS - Personal de Salud **Lectura color:** componente ■ Población general ■ Personal de Salud ■


## Conocimiento sobre el VIH y sus formas de transmisión.

Población General

Personal de salud




(69/339) de PG prefiere evitar contacto con HSH/Gays, trabajadores sexuales, TRANS, migrantes y mujeres en condición de vulnerabilidad



## Miedo a contraer el VIH

Población General

Personal de salud



**71%** (244/339) expresó sentirse preocupada de "Sacarse sangre" en el mismo laboratorio que una persona que viva con el VIH.

**76%** (259/339) refirió preocupación por utilizar los mismos utensilios de comida.

**18%** (17/91) expresó preocuparle tocar a un paciente. La mayoría de hospitales públicos.

**21%** (8/38) de los médicos y enfermeras les preocupa colocar un vendaje a un paciente que vive con VIH y el **28%** (11/38) le preocupa tomar una muestra de sangre.

## Ambiente laboral y en la comunidad

Población General

**40%** (136/339) refiere haber visto a personas en su entorno o trabajadores de la salud hablar despectivamente de las poblaciones claves y con VIH.  
**29%** (99/339) expresó haber visto negar a prestar un servicio más de una vez.  
**31%** (107/339) se siente inseguro o preferiría no ser atendido (o que su familiar se atendido) por un médico/a que previamente atendió a una persona que vive con VIH/SIDA.

Personal de salud

**18%** (16/91) refirió haber visto a trabajadores de la salud hablar despectivamente de las poblaciones claves y con VIH.  
**15%** (14/91) expresó haber visto negar a prestar un servicio más de una vez.  
**19%** (18/91) expresó sentirse inseguro/a al trabajar junto a otros/as empleados/as que viven con VIH.

**29%**

PG expresó haber visto negar a prestar un servicio más de una vez.

**15%**

PS expresó haber visto negar a prestar un servicio más de una vez.



**85%** (78/91) refirió la existencia de consecuencias si discriminan a un paciente que vive con VIH.




**98%** (90/91) expresó que en su establecimiento no es aceptable realizar la prueba de VIH sin un consentimiento previo.

La mayoría de participantes que expresaron la existencia de políticas de salud en protección de las personas que viven con VIH laboran en las ONG.

Opiniones sobre: Gays/HSH, TRSX, Migrantes y Mujeres

Población General




**78%** preferiría no tener contacto con la población de **TRANS**

59% (175/295) consideró que los grupos claves poseen una mayor promiscuidad.

66% (223/339) refirió estar de acuerdo con que la mayoría de las poblaciones claves que viven con VIH no les importa si infectan a otras personas.

67% (229/339) expresaron estar de acuerdo que estos grupos porque se involucran en conductas irresponsables.

No tendría contacto próximo (conversar, saludar de mano, compartir utensilios de comida) con personas (N=339):



Personal de salud

45% (41/91) refirió estar de acuerdo con que la mayoría de las poblaciones claves que viven con VIH no les importa si infectan a otros.

48% (44/91) refirió que estos grupos se infectan con VIH porque se involucran en conductas irresponsables.

**56%** expresó que prefiere no proveer servicios a población de HSH/Gays debido a que se involucran en conductas inmorales.

