

ATENCIÓN INTEGRAL A EMBARAZADAS ADULTAS Y ADOLESCENTES
QUE ACUDEN A CONSULTA DE PRIMERA VEZ PARA CEAS (HOSPITALES)

Normas: Protocolo de Atención para el Manejo Integral del Embarazo, el Parto y el Puerperio en Adolescentes Menores de 15 Años. Protocolo de Atención en Embarazo de Bajo Riesgo. Guía Nacional de Atención VIH/SIDA. Guía de Atención de las Embarazadas con VIH en la República Dominicana. Protocolo de Vigilancia de Infección por Sífilis.

1 ATENCIÓN AL USUARIO
1. Priorizará la gestante de consulta de 1era vez con este embarazo
2. Crea o reactiva el expediente clínico
3. Entrega proforma con analíticas:
- Paquete básico según protocolo de atención prenatal
- VIH y Sífilis

4. Facturación

2 CONSEJERÍA
1. Consejería pre-prueba para VIH y sífilis
2. Firma del consentimiento informado

3 LABORATORIO
Toma de muestra para VIH y Sífilis

4 CONSEJERÍA
1. Entrega de resultados con consejería post-prueba **(el mismo día)**
2. Envía a la usuaria a consulta prenatal

5 ÁREA DE CONSULTA
Ofrece atención completa de primera vez (las usuarias permanecerán en el hospital hasta completar su consulta). Se verifican los resultados y se procede:

REACTIVA (Prueba positiva)
Chequeo de embarazo según protocolo del MSP

NO REACTIVA (Prueba negativa)
Chequeo de embarazo según protocolo del MSP

Repetir pruebas durante el segundo y tercer trimestre

VIH
1. Iniciar de inmediato terapia antirretroviral
2. Indicar pruebas de CD4, carga viral y otros
3. Investigar infecciones oportunistas
4. Promover referimiento voluntario de pareja para prueba y tratamiento
5. Registrar en el expediente

SÍFILIS
1. Tratar con penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades
2. Tomar muestra confirmatoria el mismo dia para VDRL
3. Promover referimiento voluntario de pareja para prueba y tratamiento
4. Registrar en el expediente

Notificación obligatoria e inmediata de casos positivos !

6 ADHERENCIA
Se refiere al servicio de psicología o consejería para educación sobre la adherencia al tratamiento

ES IMPORTANTE SABER QUE:
El riesgo de transmisión materno infantil del VIH sin terapia antirretroviral puede ser hasta 25.5%.
La sífilis es causa de malformaciones y muerte fetal, puede evitarse con el uso temprano de penicilina. !
https://www.cdc.gov

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD
GIS Gestión e Innovación en Salud Grupo Consultor
unicef para cada infancia
ONUSIDA
OPS Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Américas
OPS 120